FICHA TÉCNICA

Ixchel

FERTILIZANTE ORGÁNICO

BIOESTIMULANTE ORGÁNICO

COMPOSICIÓN

Extractos de algas marinas	70.59%
Potasio (K_2O)	4%
Nitrógeno	1%
Materia Orgánica	22%
Microelementos	2.41%

OMRI LISTED®
For Organic Use

ÖKO-GARANTIE BCS

Ixchel (Extractos de semillas: maiz, avena, soja, espinaca más *ascophyllum nodosum* + acidos orgánicos de plantas superiores) poderoso bioestimulante con un alto contenido en fitohormonas naturales 2300 ppm citoquininas orgánicas (La mayor concentración de citoquininas orgánicas del mercado) y microelementos procedentes de extractos vegetales, Ixchel potencializa la división celular, induce al cuajado y aumenta el contenido de azúcares, como consecuencia aumenta el número de frutos, tamaño y consistencia de los mismos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con suficiente agua limpia, en caso de presentar molestias por el contacto con el producto, lleve a la persona con el médico. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente induzca el vómito, administre de tomar 2 vasos de agua, si la persona está inconsciente no provoque vómito y no trate de introducir nada en la boca y acuda inmediatamente al médico quien deberá leer la etiqueta.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Éste es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo, ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases de plaguicidas. Respetar las buenas prácticas agrícolas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS L/Ha	No. APLICACIONES Y EPOCA DE APLICACION
Familia *Cucurbitaceae* Melón Sandía Pepino Calabaza Calabacita Chayote Chilacayote	1, 3 y 5 ml/L de agua	Aplicaciones al follaje durante el ciclo del cultivo
Familia *Solanaceae* Jitomate Chile Chile Bell Papa Berenjena Tabaco Tomate de cáscara	200, 350 y 500 mL/Ha	Aplicaciones al follaje durante el ciclo del cultivo (brotación, floración y amarre)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Ixchel está recomendado para aplicación foliar en momentos de prefloración y posteriormente en fecundación y cuajado de frutos. Cuando existe gran cantidad de cosecha se aplicará para favorecer el engorde y homogeneidad de frutos. Se pueden realizar varias aplicaciones en función del ciclo del cultivo. Foliarmente se aplican de 50 a 100 cc/100L de agua y por fertirrigación 1.5 a 2 L/Ha. Se recomienda aplicar a primeras horas de la mañana o al atardecer.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el equipo de protección recomendado. Realizar unas pruebas de compatibilidad. Ixchel es compatible con fertilizantes N-P-K y fitosanitarios. Evitar las mezclas directas con ácidos fuertes como: sulfúrico, nítrico y fosfórico y con bases fuertes. El pH de tratamiento es de 7 a 8.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DB ORGANIC SCIENCE®

DB ORGANIC SCIENCE S.A.C.
St. 1, Gr 18, Mz. E Lt 10
Villa El Salvador Lima-Perú
Móvil: (+51) 964 770 303 –
(+51) 952 189 544

FORMULADO POR:

FIASA®

FIASA - Fertilizantes e Insumos Agrícolas S.A. de C.V.
Carretera a El Dorado Sur, No. 7490,
Campo Diez, Sinaloa, México. C.P. 80396.
Teléfono: +52 (667) 717 12 45